

ИНСТРУКЦИЯ  
по применению лекарственного  
препарата для медицинского применения

## ТРОКСЕВАЗИН®

**Регистрационный номер:** П N 012713/02

**Торговое название препарата:**

ТРОКСЕВАЗИН®

**Международное непатентованное название:** троксерутин

**Лекарственная форма:** гель для наружного применения

**Состав:**

**Активное вещество:** в 1 г геля содержится 20 мг троксерутина;

**Вспомогательные вещества:** карбомер 6 мг, троламин (триэтаноламин) 7 мг, динатрия эдетата дигидрат 0,5 мг, бензалкония хлорид 1 мг, вода очищенная 965,5 мг.

**Описание:** Гель от желтого до светло-коричневого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:**

Венотонизирующее и венопротекторное средство.

**Код АТХ** C05CA04.

**Фармакологические свойства:**

**Фармакодинамика:**

Троксевазин® представляет собой флавоноид (производное рутина). Обладает Р-витаминной активностью; оказывает венотонизирующее, венопротекторное, противоотечное, противовоспалительное, противосвертывающее и антиоксидантное действие. Уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, повышает их тонус. Увеличивает плотность сосудистой стенки, уменьшает экссудацию жидкой части плазмы и диапедез клеток крови.

Уменьшает воспаление в сосудистой стенке, ограничивая прилипание тромбоцитов к ее поверхности.

**Фармакокинетика:**

При нанесении геля на область поражения, активное вещество быстро проникает через эпидермис, через 30 мин

обнаруживается в дерме, а через 2-5 ч в подкожной жировой клетчатке.

**Показания к применению:**

- Варикозная болезнь;
- Хроническая венозная недостаточность с такими симптомами как: отечность и боли в ногах; чувство тяжести, налитости, усталости ног; сосудистые звездочки и сеточки, судороги, парестезии;
- Тромбофлебит;
- Перифлебит;
- Варикозный дерматит;
- Боли и отеки травматического характера (при ушибах, растяжениях, травмах).

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к препарату. Нарушение целостности кожных покровов.

**Беременность и период лактации:**

Данных относительно нежелательного воздействия на плод и новорожденного при использовании препарата нет.

**Способ применения и дозы:**

Наружно!

Гель наносят на область поражения 2 раза в сутки утром и вечером, мягко втирая до полного впитывания. При необходимости гель можно наносить под бинты или эластичные чулки. Успех лечения препаратом в большой степени зависит от его регулярного применения в течение длительного времени. Рекомендуется сочетать с приемом капсул Троксевазин® для усиления воздействия. Если симптомы течения заболевания ухудшаются или не проходят через 6-7 дней ежедневного применения препарата, следует обратиться к врачу, который назначит дальнейшее лечение и определит длительность курса терапии.



**Побочное действие:**

В редких случаях наблюдаются аллергические кожные реакции - крапивница, экзема, дерматит.

**Передозировка:**

Ввиду наружного способа применения и большой терапевтической широты препарата, опасности возникновения передозировки нет. При случайном проглатывании большого количества геля необходимо провести общие меры выведения препарата из организма (рвотные средства) и обратиться к врачу. При наличии показаний проводится перитонеальный диализ.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

В настоящее время данные о лекарственном взаимодействии препарата Троксевазин® отсутствуют.

**Меры предосторожности при применении:**

Гель наносят только на неповрежденную поверхность.

Избегать попадания на открытые раны, глаза и слизистые оболочки!

При состояниях, характеризующихся повышенной проницаемостью сосудов (в т.ч. при скарлатине, гриппе, кори, аллергических реакциях), гель используют в сочетании с аскорбиновой кислотой для усиления ее эффекта.

**Вождение автомобиля и работа с механизмами**

Троксевазин® гель не оказывает влияния на способность управлять автотранспортным средством и работать с движущимися механизмами.

**Форма выпуска:**

Гель для наружного применения 2%.

По 40 г в алюминиевую тубу с внутренним лаковым покрытием, с алюминиевой мембраной или в ламинатную (пластиковую) тубу с алюминиевой мембраной. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

**Условия хранения:**

При температуре не выше 25 °С. Не замораживать!

Хранить в недоступном для детей месте!

**Срок годности:**

Для алюминиевой тубы – 5 лет.

Для ламинатной (пластиковой) тубы – 5 лет.

Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска из аптек:**

Без рецепта.

**Производитель:**

“БАЛКАНФАРМА-ТРОЯН” АД  
Болгария, г. Троян, ул. Крайречна 1

тел: (+359 670) 68 104;

факс: (+359 670) 62 610

**Организация, уполномоченная производителем на принятие претензий от потребителей:**

ООО “Активис”

115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35

Тел.: (495) 644-44-14, факс (495) 644-44-24

