

ИНСТРУКЦИЯ  
по применению лекарственного  
препарата для медицинского применения  
**ТРОКСЕВАЗИН® НЕО**

Регистрационный номер: ЛП-002139

Торговое название препарата:

ТРОКСЕВАЗИН® НЕО

МНН или группировочное название:

троксерутин+гепарин натрия+декспантенол

Лекарственная форма:

гель для наружного применения

#### Состав

В 1 г геля содержится:

Активные вещества:

троксерутин 20 мг, декспантенол 50 мг, гепарин натрия 1,7 мг (соответствует 300 МЕ);

Вспомогательные вещества:

карбомер 7 мг, пропиленгликоль 100 мг, метилпарагидроксibenзоат 0,8 мг, пропилпарагидроксibenзоат 0,2 мг, троламин 4,2 мг, вода очищенная до 1 г.

#### Описание

Прозрачный или почти прозрачный гель от желтоватого до зеленовато-желтого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** антикоагулянтное средство прямого действия для местного применения+прочие препараты  
**Код АТХ** C05BA53

#### Фармакологические свойства

##### Фармакодинамика

Троксевазин® Нео - комбинированный препарат для наружного применения. Действие обусловлено входящими в его состав ингредиентами:

*Троксерутин* - ангиопротекторное средство.

Обладает Р-витаминной активностью: оказывает венотонизирующее, венопротекторное, противоотечное, противовоспалительное, противосвертывающее и антиоксидантное действие. Уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, повышает их тонус. Увеличивает плотность сосудистой стенки. Способствует нормализации микроциркуляции и трофики ткани, уменьшает застойные явления.

*Гепарин* - антикоагулянт прямого действия, естественный противосвертывающий фактор организма. Препятствует тромбообразованию, активирует фибринолитические свойства крови, улучшает местный кровоток.

Оказывает противовоспалительное действие, способствует регенерации соединительной ткани за счет угнетения активности гиалуронидазы.

*Декспантенол* - провитамин В<sub>5</sub> - в коже превращается в пантотеновую кислоту, входящую в состав кофермента А, который играет важную роль в процессах ацетилирования и окисления. Улучшая обменные процессы, декспантенол способствует регенерации поврежденных тканей; улучшает всасывание гепарина.

##### Фармакокинетика

При местном применении активные вещества быстро абсорбируются кожей.

*Гепарин* накапливается в верхних слоях и активно связывается с протеинами кожи. При наружном применении незначительное количество гепарина проникает в системный кровоток, не оказывая системного действия, не вызывая каких-либо изменений параметров свертывания крови. Не проникает через плацентарный барьер.

*Декспантенол* проникает во все слои кожи и превращается в пантотеновую кислоту, связывается с белками плазмы (главным образом с бета-глобулином и альбумином). Пантотеновая кислота не подвергается в организме метаболизму и выводится в неизменном виде. *Троксерутин* через 30 минут обнаруживается в дерме, а через 2-5 часов в подкожной жировой клетчатке. Проникновение троксерутина в системный кровоток клинически незначимо.

#### Показания к применению

- Варикозная болезнь;
- Хроническая венозная недостаточность с такими симптомами как: отечность и боли в ногах; чувство тяжести, налитости, усталости ног; сосудистые звездочки и сеточки, судороги, парестезии;
- Тромбофлебит;
- Перифлебит;
- Варикозный дерматит;
- Боли и отеки травматического характера (при ушибах, растяжениях, травмах).

#### Противопоказания

- открытые инфицированные раны или раны



- с обильной экссудацией в месте нанесения;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- возраст младше 18 лет (опыт применения отсутствует).

### **Применение при беременности и в период кормления грудью**

Троксевазин® Нео разрешен к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

### **Способ применения и дозы**

Наружно! Гель наносят тонким слоем на область поражения 2 раза в сутки утром и вечером, равномерно распределяя по поверхности кожи легкими втирающими движениями до полного впитывания. При необходимости гель можно наносить под бинты или эластичные чулки.

Успех лечения препаратом в большой степени зависит от его регулярного применения в течение длительного времени. Курс лечения составляет 2-3 недели. Необходимость более длительного лечения определяет лечащий врач.

Повторный курс лечения рекомендуется проводить 2-3 раза в год.

Рекомендуется сочетать с приемом капсул Троксевазин® для усиления воздействия.

### **Побочное действие**

*Аллергические реакции:* кожная сыпь, зуд (в месте нанесения препарата).

### **Передозировка**

Передозировка маловероятна в связи с малой системной абсорбцией активных компонентов геля.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Взаимодействия препарата Троксевазин® Нео с другими лекарственными средствами не выявлено.

### **Особые указания**

Избегать попадания на открытые раны, слизистые оболочки и в глаза!

Препарат Троксевазин® Нео не предназначен для применения в офтальмологии, для интравагинального и ректального введения.

### **Влияние на способность управления автомобилем и/или работу с другими механизмами**

На фоне приема препарата какого-либо отрицательного влияния на способность управлять автомобилем или другими техническими средствами не наблюдалось.

### **Форма выпуска**

Гель для наружного применения.

По 40 г препарата в мембранную алюминиевую тубу, по 40 г или 100 г препарата в мембранную ламинатную тубу. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

### **Срок годности**

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

### **Условия отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Держатель регистрационного удостоверения «Актавис Групп ПТС ехф» (Исландия), произведено «БАЛКАНФАРМА-ТРОЯН АД», г. Троян, ул. Крайречна 1, Болгария  
тел: (+359 670) 68 104; факс: (+359 670) 62 610

### **Претензии потребителей направлять по адресу:**

ООО «Актавис»

119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 4  
Тел.: (495) 644-44-14, факс: (495) 644-44-24

 **actavis**

AAAI4039

